



ประกาศคณะแพทยศาสตร์

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใช้หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย และหน้ากาก N95
ในสถานการณ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางคณะแพทยศาสตร์
ขอกำหนดแนวทางการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อดูแลผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยโรคดังกล่าวโดย
มีรายละเอียดต่อไปนี้.-

แนวทางการใช้หน้ากาก N95

1. บุคลากรที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อ หรือ ยืนยันว่ามีการติดเชื้อ COVID-19 ที่ PUI clinic หรือ ตึกโรคปอด
2. บุคลากรที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อ หรือ ยืนยันว่ามีการติดเชื้อที่แพร่กระจายทางอากาศ (aerosol or airborne transmission) ได้แก่ โรควัณโรค โรคหัด โรคอีสุกอีใส โรคงูสวัด แบบแพร่กระจาย รวมถึงโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุ
3. เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) โรควัณโรค

แนวทางการใช้หน้ากากอนามัย (Surgical mask)

1. บุคลากรที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ที่ URI clinic/PUI clinic/จุดคัดกรองโรค ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล
* ผู้ที่ไม่ได้มีหน้าที่สัมผัสผู้ป่วยโดยตรง เช่น พนักงานทำความสะอาดทั่วไป ให้สวมหน้ากากผ้า
2. เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ (นอกเหนือจากกลุ่มที่จำเป็นต้องใช้ N95)
3. บุคลากรที่ทำการผ่าตัด ให้ปฏิบัติตามแนวทางของแต่ละภาควิชา โดยให้พิจารณาใช้หน้ากากอนามัยในการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (surgical site infections) เช่น การใส่อุปกรณ์เทียม การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ การผ่าตัดหลอดเลือด เป็นต้น หรือการผ่าตัดผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ตับอักเสบบีหรือเอชไอวี
4. ทันตแพทย์
5. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (aerosol or airborne transmission) เช่น การส่องกล้องส่องหลอดลม (bronchoscopy), การใส่ท่อช่วยหายใจ, การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR), การดูดเสมหะ ที่ไม่มีข้อบ่งชี้สำหรับการใช้ N95

กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีข้อบ่งชี้ในการใช้หน้ากากอนามัย ขอความร่วมมือในการใช้
หน้ากากอนามัยเวอร์ล 1 ขึ้นต่อคน ยกเว้นแต่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนหน้ากากเนื่องจากเป็นสารคัดหลั่งหรือ
เลือดหรือสิ่งสกปรกชัดเจน

