



ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะดูแลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID-19
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 1
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565

ตามที่ได้มีการประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 เพื่อให้การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอกำหนดแนวทางปฏิบัติในการสวมอุปกรณ์ป้องกันและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กรณีให้การดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในทุกหอผู้ป่วยและทุกห้องตรวจของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ดังนี้

1. กิจกรรมที่ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายในอากาศได้ (aerosolized generating procedures) เช่น bronchoscopy, endotracheal intubation, surgical airway, cardiopulmonary resuscitation (CPR), การใช้ high-flow nasal cannula (HFNC), nasopharyngeal and throat swab, การพ่นยา, การเปลี่ยน ventilator circuit และการดูดเสมหะ เป็นต้น ให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (personal protective equipment; PPE) ดังนี้
 - 1.1 N-95 mask
 - 1.2 ถุงมือ
 - 1.3 Face shield
 - 1.4 กาวน์กันน้ำ
2. กิจกรรมที่ไม่ได้ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายในอากาศได้ ให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองตาม standard precautions และ droplet precautions ดังนี้
 - 2.1 Surgical mask
 - 2.2 ถุงมือ
 - 2.3 Face shield เมื่อปฏิบัติกิจกรรมที่คาดว่าอาจมีการกระเด็นของเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยสู่บุคลากร
 - 2.4 กาวน์กันน้ำ เมื่อปฏิบัติกิจกรรมที่คาดว่าอาจมีการกระเด็นของเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยสู่บุคลากร
3. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID-19 ระหว่างหอผู้ป่วยหรือห้องตรวจ ไม่จำเป็นต้องใช้แคปซูลความดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 - 3.1 กรณีผู้ป่วยไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ ไม่ได้ใช้ออกซิเจน หรือใช้ O₂ nasal cannula

- 3.1.1 ให้ผู้ป่วยสวม surgical mask
- 3.1.2 ให้ผู้ป่วยล้างมือก่อนขึ้นล้อหรือเปลนอน
- 3.1.3 บุคลากร สวม surgical mask และถุงมือ
- 3.2 กรณีผู้ป่วยไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ และใช้ออกซิเจนอัตราไหลสูง (High flow nasal cannula)
 - 3.2.1 ให้ผู้ป่วยสวม surgical mask
 - 3.2.2 ให้ผู้ป่วยล้างมือก่อนขึ้นล้อหรือเปลนอน
 - 3.2.3 บุคลากรสวม N-95 mask, ถุงมือ, กาวกันน้ำ และ face shield
 - 3.2.4 แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีนี้ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อสูงกว่ากรณีอื่น
- 3.3 กรณีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ให้บุคลากรสวม N-95 mask, ถุงมือ, กาวกันน้ำ และ face shield

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่